

ROYAUME DU MAROC

ECOLE SUPERIEURE DE
TECHNOLOGIE EL KELAA
DES SRAGHNA

UNIVERSITE CADI AYYYAD



المدرسة العليا للتكنولوجيا
قلعة السراغنة

École Supérieure
de Technologie d'El Kelâa
des Sraghna

المملكة المغربية

المدرسة العليا للتكنولوجيا قلعة
السراغنة

جامعة القاضي عياض

RAPPORT DE STAGE

Filière : Génie Agronomique

Suivi de la production des agrumes
Cas de domaine EL OUDAYA

Présenté et soutenu par :

AREJDAL Mohamed

Jury:

Pr.	JAOUAD Yasmine	(Ecole Supérieure de Technologie KS)
Pr.	DHASSI Khalid	(Ecole Supérieure de Technologie KS)
Pr.	LAMHAMDI Mostafa	(Ecole Supérieure de Technologie KS)

EST - El Kelâa des Sraghna, le 8 Septembre 2022

Remerciements

Ce travail est le résultat d'un effort auquel ont participé plusieurs personnes. J'ai l'honneur d'être celui qui leur exprime ses sincères remerciements.

Tout d'abord, je tiens à remercier vivement M. OCHEN Abdullah de m'avoir donné cette opportunité pour passer ce stage qui s'insère dans le programme de ma formation pédagogique au sein de l'Ecole Supérieure de Technologie d'El Kelâa des Sraghna. M. OCHEN ainsi que tout le cadre technique du domaine EL OUDAYA m'ont fourni toutes les informations relatives au domaine de l'agriculture, ses défis et problèmes

Je tiens également à remercier Monsieur MAHI Noureddine pour son aide et ses informations, c'est grâce à ces consignes et ses orientations que j'ai pu acquérir énormément d'informations.

Je tiens aussi à remercier M. DHASSI Khalid de m'avoir soutenu toute la période de du stage.

On adresse également notre gratitude et notre reconnaissance à tout le cadre administratif de l'Ecole Supérieure de Technologie d'El Kelâa des Sraghna pour tous les efforts déployés pour réussir notre formation.

Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et l'enrichissement de ce modeste travail.

Résumé

La domaine EL OUDAYA est situé sur la route nationale 17 Agadir -Essaouira. L'activité agricole dominante dans EL OUDAYA est la production d'agrumes, et cela est dû au manque d'eau, à cause de cela plusieurs cultures ont été éliminer, comme les olives, raisins et autres...

La ferme utilise le système d'irrigation goutte à goutte pour des rendements abondants et pour économiser l'eau. La ferme possède une station de tête très équipée, ainsi que des machines pour les traitements et la récolte, en plus de la taille.

Domaine EL OUDAYA est une filiale du groupe Providence Verte et a son siège social à Rabat.

La majeure partie de la production agricole d'EL OUDAYA est exportée hors du Maroc, et le marché européen et russe est l'un des marchés d'exportation préférés pour EL OUDAYA

Liste des figures

Figure 01 : Carte géographique de la région	8
Figure 02 : Rapport d'analyse du sol	9
Figure 03 : L'organigramme de l'exploitation	10
Figure 04 : Plan parcellaire	11
Figure 05 : Les secteur de domaine	12
Figure 06 : Refractomètre	19
Figure 07 : Le bassin	20
Figure 08 : Géomembrane	20
Figure 09 : Les fouteurs	21
Figure 10 : Rapport d'analyse d'eau de puits	21 et 22
Figure 11 : Rapport d'analyse d'eau de bassin	23
Figure 12 : L'ordinateur d'irrigation	24
Figure 13 : Cartes des parcelles	25
Figure 14 : Les filtres à sables	26
Figure 15 : Les filtres à tamis	27
Figure 16 : Les filtres à disques	27
Figure 17 : Les cuves des engrais et l'acide	28
Figure 18 : Le bac de mélange des engrais	28
Figure 19 : Pompe doseuse	29
Figure 20 : Taux d'eau	29
Figure 21 : La taille	30
Figure 22 : Symptôme de la gommose	31
Figure 23 : Ceratitis Capitata	32
Figure 24 : Cyle de vie de la Ceratitis Capitata	32
Figure 25 : Le piège.....	33
Figure 26 : Fly Cap	33

Liste des tableaux

Tableau 1 : Fiche signalétique d'EL OUDAYA	10
Tableau 2 : L'identification de l'exploitation	10
Tableau 3 : la superficie de chaque secteur	12
Tableau 4 : Statistiques sur les agrumes selon le ministère de l'agriculture	15
Tableau 5 : Les principaux variétés des agrumes au Maroc	16
Tableau 6 : Les principaux variété d'el OUDAYA et leur surface	18

Sommaire

♦ Avant-propos	6
----------------------	---

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA REGION DE L'EXPLOITATION

1. Monographie de la région	8
1.1 Situation géographique	8
1.2 Données pédoclimatiques	8
a. Climat	8
b. Pédologie	8
2. Description de l'exploitation	10
2.2 Fiche signalétique de l'exploitation	10
2.2 Identification	10
2.3 L'organigramme de l'exploitation	10
2.4 Plan parcellaire	11

CHAPITRE II : CONDUITE DE CULTURE DES AGRUMES

1. La culture des agrumes	14
1.1 Taxonomie	14
1.2 Importance économique des agrumes au Maroc	15
1.3 Les différentes variétés cultivées au Maroc et leurs caractéristiques	15
1.4 Les différents porte-greffes utilisés au Maroc et leurs caractéristiques	17
1.5 La culture au niveau d'EL OUDAYA	17
1.5.2 Les variétés	17
1.5.2 Maturité interne	18
2. Irrigation	19
2.1 Source d'eau	19
2.2 Le stock d'eau	20
2.3 L'analyse d'eau	21
2.4 Système de pompage	24
2.5 Système d'irrigation	24
2.6 La pluviométrie à la parcelle	25
3. Station de tête	26
3.1 System de filtration	26
3.1.1 Filtre à sable	26
3.1.2 Filtre à tamis	26
3.1.3 Filtre à disque	27
3.2 Fertigation	28

4. La taille	29
5. Les maladies et le traitement	31
5.1 Les maladies fongiques	31
5.2 Les ravageurs	32
6. Conclusion	34
7. Cahier de journal	36
8. Annexe	37
9. Référence	40

Avant-propos

Les stages permettent aux étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises le long de leur formation académique. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la formation pédagogique assurée par l'Ecole Supérieure de Technologie d'El Kelâa des Sraghna pour l'obtention du Diplôme Universitaire de technologie (DUT). Le déroulement de mon stage a été au sein du domaine EL OUDAYA situé dans la région de Marrakech entre le 25/07/2022 et 25/08/2022.

L'objectif de ce stage (Stage d'initiation) est d'approfondir nos connaissances théoriques et découvrir le domaine de l'agriculture de la manière la plus fine et la plus approfondie possible, de matériel utilisé et de gestion de la ferme.

Pendant la période du stage, on m'a confié des tâches pratiques, notamment :

- Entretien du réseau d'irrigation
- La taille
- L'irrigation
- Processus de mastic (si l'arbre est blessé par la taille..., On utilise le mastic pour fermer la blessure en vue d'éviter la propagation des champignons.)
- Suivi de la maturité interne des fruits

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA REGION DE L'EXPLOITATION

1. Monographie de la région

1.1 Situation géographique

Le domaine EL OUDAYA est situé dans la région de TANSIFT EL HAOUZ à 17 km de Marrakech sur la route national 17 d'Essaouira-AGADIR.



Figure 1 : Carte géographique de la région

1.2 Données pédoclimatiques

1.2.1 Climat

Le climat dominant dans la région est assez doux, il est de type semi-aride caractérisé par un été chaud et sec et un hiver relativement humide. Durant la période du stage, la température la moyenne maximale et minimale enregistrées a été respectivement de l'ordre de 40.2 °C et 30.8°C. [1]

1.2.2 Pédologie

D'après les informations acquises de l'office du Haouz, le sol est généralement de type argilo-limoneux à limoneux, [2]


Concernant le domaine EL OUDAYA, l'analyse du sol montre que l'horizon 1 (H1) de 00-30cm a une texture Limono argileuse, et l'horizon 2 (H2) de 30-60 cm a une texture argileuse :

Rapport d'analyses de Sol

Client	ELOUDAYA				Profondeur	N° Labo			
Domaine	ELOUDAYA 2				Horizon H1	0-30 cm	C015197	Date de prélèvement	16/04/2016
Commune	LOUDAYA		Culture	Agrumes	Horizon H2	30-60 cm	C015198	Date de réception	19/04/2016
Province	MARRAKECH		Pays	MAROC				Date fin d'analyse	27/04/2016
Parcelle	6117001: CLEMENTINE-NOUR-P-41102			GPS	N-°	W-°		Date édition	29/04/2016

Granulométrie (%)

NF X31-107



Statut Acido-Basique

			Très faible	Faible	Adéquat	Élevé	Très élevé	
pH eau*	H1	8.4						
ISO 10390	H2	8.6						6,7 à 7,5
	H3							
pH KCl*	H1							
ISO 10390	H2							
	H3							

Calcaire Total* %	H1	12.7						
H2	14.8							< 15
H3								
NF ISO 10693								
Calcaire Actif* %	H1	7.9						
H2	8.1							< 10
H3								
NFX 31-106								
CaO mg/kg	H1	7025						4306 à 6459
H2	7977							4061 à 6092
H3								
NFX 31-108								

Etat humique (%)

			Très faible	Faible	Adéquat	Élevé	Très élevé	
Matière Organique C* x 1,724	H1	1.69						> 1.9
NF ISO 14235	H2	1.48						> 1.9
	H3							
Azote Total	H1							
NF ISO 11261	h2							
	H3							
Rapport C/N	H1							Adéquat
	H2							
	H3							

Éléments échangeables / assimilables

A. Phosphorique P ₂ O ₅ Olsen* mg/kg	H1	47						22.93 à 40.46
H2	27							22.73 à 40.12
H3								
NF ISO 11263								
Potasse K ₂ O* mg/kg	H1	682						296 à 560
H2	650							290 à 549
H3								
NFX 31-108								
Magnésie MgO* mg/kg	H1	1256						95 à 191
H2	1316							92 à 184
H3								
NFX 31-108								

Extrait Aqueux 1/5 (mg/100g)

Flux continu Oligo-éléments

	H1	H2	H3	
Potassium (K)				Adéquat
Sodium (Na)				
Magnésium (Mg)				
Calcium (Ca)				
Ammonium (N-NH ₄)	0.61	0.58	0.2 à 0.5	
Nitrate (N-NO ₃)	0.75	0.44	5 à 8	
Phosphore (P)				
Chlorures (Cl)	5.58	4.55	< 25	
Sulfate (SO ₄)				

Cuivre* mg/kg	H1	3.71						0.2 à 0.35
H2	2.82							0.2 à 0.35
H3								
NFX 31-121								
Manganèse* mg/kg	H1	7.41						3 à 8
H2	7.73							
H3								
NFX 31-121								
Fer* mg/kg	H1	5.67						10 à 20
H2	10.30							
H3								
NFX 31-121								
Zinc* mg/kg	H1	1.43						0.74 à 1.45
H2	0.67							0.77 à 1.52
H3								
NFX 31-121								
Bore soluble* mg/kg	H1							
H2								
H3								
NFX 31-122								

Autres éléments

	H1	H2	H3	
EC 1/5 (mmhos/cm)	0.56			Adéquat
NF ISO 11265	H2	0.32		< 0,4
	H3			
Sodium Na ₂ O* mg/kg	H1	78		< 896
NFX 31-108	H2	70		< 994
	H3			
CEC meq/100g	H1			Adéquat
NFX 31-130	H2			
	H3			

Coordinateur

Versions en vigueur des méthodes d'analyse

Directeur du laboratoire

* essai accrédité

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale (page 1/1)

1, boulevard Bangkok - Route de Zenata km 10,5 - Sidi Bemoussi - 20 000 Casablanca

Tél. : +212 522 346 890/95 - Fax : +212 522 358 364 - contact@labomag.ma - www.labomag.ma

S.A.R.L au capital de 1 000 000 DH - R.C. : 103929 - I.F. : 01901033 - C.N.S.S. : 62844153 - Patente : 30655862

2. Description de l'exploitation.

2.1 Fiche Figure 2 : Rapport d'analyse du sol

Le domaine d'EL OUDAYA a été créé depuis les années cinquante du siècle dernier. En 1971 il a été sous la direction de la SODEA (Société de développement agricole) et en 2006/2007 il est devenu un domaine du groupe 'les domaines Agricoles'

Tableau 1 : Fiche signalétique d'EL OUDAYA


Nom de domaine	Domaine EL OUDAYA
Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée
Adresse	La route national 17 Essaouira-AGADIR,
Gmail	domaineeloudaya@gmail.com

2.2 Identification

Tableau 2 : L'identification de l'exploitation

Groupe	Providence Verte
Région	TANSIFT EL HAOUZ
Préfecture	Marrakech
Province	Saadâ Marrakech
Caida	SOUIHLA
Superficie	260ha

2.3 L'organigramme de l'exploitation



Gérant : Qui gère le **Figure 3: L'organigramme de l'exploitation** ontrôle aussi la qualité du travail de traitement, l'irrigation et des techniques culturales.

Comptable : Responsable sur la comptabilité de l'exploitation (Gestion financière de l'exploitation agricole, etc...)

Technicien : La personne qui s'occupe des travaux de production (semis, récolte, irrigation, etc.) et qui assure le bon état des équipements et des installations

Responsable de qualité : Contrôle la qualité de la production

3.3 Plan parcellaire




Figure 4 : Plan parcellaire

LOT 1		
Secteur 1	160,33 has	160,31 m ² /h
Secteur 2	167,17 has	167,17 m ² /h
Secteur 3	168,06 has	168,06 m ² /h
LOT 2		
Secteur 1	167,56 has	167,58 m ² /h
Secteur 2	168,26 has	168,27 m ² /h
Secteur 3	164,83 has	164,82 m ² /h
LOT 3		
Secteur 1	194,03 has	194,03 m ² /h
Secteur 2	184,22 has	184,02 m ² /h
Secteur 3	192,31 has	192,37 m ² /h

Figure 5 : Les secteur de domaine

Tableau 3 : la superficie de chaque secteur

Les secteur	Superficie en hectares
Secteur 1, LOT 1	16.90
Secteur 2 LOT 1	17.60
Secteur 3, LOT 1	17.70
Secteur 1, LOT 2	17.60
Secteur 2, LOT 2	17.70
Secteur 3, LOT 2	17.30
Secteur 1, LOT 3	20.50
Secteur 2, LOT 3	19.40
Secteur 3, LOT 3	20.20

Le tableau ci-dessus, représente la superficie de chaque secteur en fonction du lot

CHAPITRE II : CONDUITE DE LA CULTURE DES AGRUMES

1. La culture des agrumes

1.1 Taxonomie [3]

Règne :	Végétal
Embranchement :	<i>Spermaphytes</i>
Sous- embranchement :	<i>Angiospermes</i>
Classe :	<i>Eudicotylédones</i>
Ordre :	<i>Rutales</i>
Sous classe :	<i>Rosidées</i>
Famille :	<i>Rutacées</i>
Sous famille :	<i>Aurantoideae</i>
Tribu :	<i>Citreae</i>
Sous-tribu :	<i>Citrinae</i>
Genres principaux :	<i>Citrus – Fortunella – Poncirus</i>

Avec ces 145 espèces dénombrées, le genre *Citrus* est le plus important. C'est au sein de ce genre que se rencontrent les principales espèces cultivées :

Les oranges : *Citrus sinensis* ;

Les mandarines : *Citrus reticulata* ;

Les clémentines : *Citrus clementina* ;

Les citronniers : *Citrus limon* ;

Les pomelos : *Citrus paradisi*.

1.3 Importance économique des agrumes au Maroc

La culture d'agrumes au Maroc est un vecteur clé qui contribue à la croissance économique de l'agriculture marocaine. Elle a connu un développement important depuis l'entrée en vigueur du contrat-programme signé en 2008 entre l'Etat et la profession dans le cadre du Plan Maroc Vert. [4]

- ▲ En 2019, les exportations d'agrumes se sont élevées à 607 200 tonnes, contre 460,6 tonnes en 2009, enregistrant une croissance de 32 %. [5]

Tableau 4 : Statistiques sur les agrumes selon le ministère de l'agriculture

Le produit en milliers de tonnes	2009	2019	Variation en pourcentage
Les petites fruits	276.3	447.6	62%
Clémentine	202.6	168.7	-17%
Nadorcott	13.9	141.9	975%
Nour	48.5	113.4	134%
Les oranges	179.1	148.3	-17%
Maroc Latte	106.9	92.5	-14%
Navel	25	31	24%
Mawardi	30.3	15.5	-49%
Autres agrumes	5.3	11.4	115%
Total	460.6	607.2	32%

Marché en milliers de tonnes	2009	2019	Variation en pourcentage
L'Union européenne (UE)	190.5	239.1	26%
Russia	197.1	196.5	-0.30%
Canada	48.3	65.1	35%
États-Unis	12	49.2	310%
Pays du golf	4.7	26.4	x5.6
Afrique sub-saharienne	2.1	25.3	x12
Autres marchés	5.9	5.7	-4%
Total	460.6	607.2	32%

1.3 Les différentes variétés cultivées au Maroc et leurs caractéristiques

Le tableau ci-dessous montre certaines des variétés les plus importantes trouvées au Maroc [6] :

Tableau 5 : Les principaux variétés des agrumes au Maroc

Les variétés	Les caractéristiques
Navel	Le navel est une variété d'orange caractérisée par la croissance d'un deuxième fruit à l'apex, qui ressemble à un nombril humain et peut dépasser légèrement.
Maroc Latte	La Maroc Latte est une orange à maturité très tardive. Sa chair se caractérise par un taux de jus exceptionnellement élevé et une saveur d'une grande qualité gustative.
Clémentine	La clémentine est un agrume, fruit du clémentinier (Citrus × clementina), un arbre hybride de la famille des rutacées¹, issu du croisement entre un mandarinier (Citrus reticulata) et un oranger (Citrus sinensis)
Nour	Fruit tardif de taille moyenne, sans pépins, d'une coloration orangée et d'une saveur délicate et bien parfumée. Le taux de jus peut atteindre ou dépasser 50%.
Sidi Aissa	Est un fruit de taille moyenne à basse et a une forme globuleuse et une belle coloration orangée à maturité. La chair est sans pépins et très juteuse.
Afourer	La variété Afourer a acquis une renommée mondiale grâce au caractère « fruit sans pépin ». Fruit tardive facile à peler, calibre moyen, peau rouge orangé brillante, fruit de haute qualité et d'une grande profondeur de saveur et d'acidité.
Marisol	Est un fruit précoce, leur arbre est vigoureux et avec un développement vers le haut et forte productivité, fruit est juteux, avec un calibre moyen à grand, une peau fine
Eureka	Un fruit petit, juteux, sans pépins, avec une écorce moyenne à mince et un taux d'acide élevé.

1.5 Les différents porte-greffes utilisés au Maroc et leurs caractéristiques [7]

Les meilleurs porte-greffes pour les agrumes comme les orangers ou les citronniers :

- *Le poncirus* :

Il ne tolère pas le calcaire et est très sensible à l'écaillement de l'écorce (exocortis). Tolérant face à la tristeza, il améliore la résistance au froid, si vous avez un sol acide, c'est le porte-greffe qu'il vous faut.

- *Le bigaradier* :

C'est un bon porte-greffe pour le citronnier et il supporte bien les sols calcaires. Il confère aux arbres une belle vigueur

- *Le citrange Troyer* :

C'est un hybride d'oranger et de Poncirus, il est performant pour servir de porte-greffe aux kumquats, aux orangers et aux clémentiniers. Il favorise un développement vigoureux des arbres et les rend plus productifs. Il craint le calcaire. Sa résistance au froid est bonne (jusqu'à -5 °C).

- *Les citranges* :

Il n'aime pas le sol calcaire. Ils amélioreront les rendements

- *Citrus volkameriana* :

Frileux, il donnera lui aussi une belle vigueur aux arbres.

1.5 La culture au niveau d'EL OUDAYA

1.5.2 Les variétés

Plusieurs variétés sont cultivées au domaine EL OUDAYA. Le tableau ci-dessous résume le profil variétal de l'exploitation avec les superficies correspondante pour chaque variété. (Annexe, F1).

Tableau 6: Les principaux variété d'el OUDAYA et leur surface

Variétés	Navel	Maroc Latte	Ain Taoujdat	Sidi Aissa	Nour
Surface en ha	35.01	38.36	18.63	13.3	26.59

2.5.2 Maturité interne

Un fruit est considéré mur et de bonne qualité quand il répond à certaines normes.

Parmi ces normes on cite :

- Le taux de jus : doit être > doit à 40%
- Le rapport E/A : doit aussi être supérieur ou égale 7.

Détermination du taux de jus


Un échantillon de 1 kg de fruit est prélevé puis pressé. Le jus est récupéré et pesé pour déterminer le pourcentage en jus.

L'acidité

Pour la détermination du taux d'acidité, 5 ml d'eau distillée et 2 ou 3 gouttes d'éthanol sont ajoutés à 10 ml du jus. Après, on effectue le dosage acido-basique par l'ajout de NaOH au jus, jusqu'au point virage (changement de la couleur).

Matériels d'expérience :

Constituant de matériels de dosage




- Exemple de suivi de maturité interne se fait en 2017, par domaine el OUDAYA (Annexe, F1)

➡ Au cours de stage on a fait cette expérience :

Date	Plle	Variété	Poids	Poids jus	Tare	P. net jus	%jus	Brix	V. de NaOH	Acide	E/A
28/07/2022	25104	M.Late	1048.64g	620.28g	120.2g	500.08g	48%	14	20ml	1.28	11
28/07/2023	25104	M.Late	1048.64g	620.28g	120.2g	500.08g	48%	13.5	19ml	1.22	11



À l'aide de
refractomètre on
peut déterminer le
Brix(E).



La valeur de Brix(E) est
13.5

Figure 6 : Refractomètre

On déduit l'acidité du jus par la relation suivante : $(20 \times 0.0064 \times 100) / 10 = 1.22$

- ▲ Dans le cas de l'échantillon qu'on a traité, les fruits sont murs car le taux de jus est de l'ordre de 48% (Supérieur à 40%), et d'un rapport E/A rapport e 11 (supérieur à 7).

2. Irrigation

2.1 Source d'eau

Les forages constituent la principale source de l'eau pour le domaine EL OUDAYA. Ils sont au nombre de 9, uniquement 7 sont encore fonctionnels. Chaque puits est équipé d'une pompe émergée.

2.2 Stockage d'eau

Le bassin est le milieu de stockage et de décantation d'eau, au niveau d'EL OUDAYA il y a 2 bassins, les dimensions de bassin principale sont :

- Largeur : 78m
- Longueur : 138m
- Profondeur : 6m



Figure 7 : Le bassin



Géomembrane :

Barrière entre l'eau et le sol, il joue le rôle d'un imperméabilisant, pour éviter la destruction du bassin.

Figure 8 : Géomembrane



Les flotteurs :

Absorber l'augmentation de volume d'eau pour éviter la descente des tubes

Figure 9 : Les fouteurs

2.3 L'analyse d'eau

Afin d'assurer une bonne production, il faut prendre soin de l'eau, c'est pourquoi le domaine procède chaque année à des analyses de l'eau pour connaître sa qualité

L'eau de Puits (2020) :



RAPPORT D'ANALYSES N° B113789

ANALYSES D'EAU

Client : **DOMAINE ELOUDAYA**

Nature de l'échantillon : Eau de Potabilité

Date et heure de prélèvement : 19/11/2020

T°C de prélèvement : -

Identification de l'échantillon : Puits N°1 - Marrakech - Loudaya

Description de l'échantillon : GPS: N: 31.37.281 - W: 008.099.74

Laboratoire : **LABOMAG**

Date de réception : 20/11/2020

Date d'exécution : 20/11/2020

Date d'édition : 23/11/2020

Préleveur: KENNI Lahcen

TABLEAU DE RESULTATS

Paramètres recherchés	Méthodes	Unités	(2) Critères	Résultats
(1) Coliformes 36°C	NM ISO 9308-1 2007	UFC / 100ml	0	Non détecté
(1) Entérocoques intestinaux	NM ISO 7899-2 2007	UFC / 100ml	0	Non détecté
(1) Escherichia coli 44°C	NM ISO 9308-1 2007	UFC / 100ml	0	Non détecté
(1) Micro-organismes revivifiables 22°C	NM ISO 6222 2007	UFC / ml	10 ²	<1
(1) Micro-organismes revivifiables 36°C	NM ISO 6222 2007	UFC / ml	20	<1
(1) Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs 37°C (clostridia)	NM ISO 6461-2 2007	UFC / 100ml	0	Non détecté

CONCLUSION ET OBSERVATIONS

Echantillon reçu répond aux critères microbiologiques d'une eau potable selon la norme marocaine.

Responsable de département

LABOMAG
Fatimazahra NAMER
Responsable Département
Microbiologie

Directeur du laboratoire

LABOMAG
ABDELILLAH LE MERHIYERATTE
DIRECTEUR DES LABORATOIRES
TEL: 0522 346 890/95

(1) Le laboratoire Labomag est accrédité NM ISO 17025 MCI/CA/AL18/2007. Seuls les paramètres signalés par (1) sont inclus dans la portée d'accréditation.

(2) NM 03.7.001

La conclusion est faite sans tenir compte des incertitudes associées aux résultats.

(NE) : nombre estimé: estimation moins fidèle de la valeur vraie

(N) : seule la boîte contenant la dernière dilution la plus élevée permet une numération

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

1, boulevard Bangkok – Route de Zenata km 10,5 – Sidi Bernoussi – 20 000 Casablanca –
Tél. : + 212 522 346 890/95 – Fax : + 212 522 358 364 – contact@labomag.ma – www.labomag.ma
S.A.R.L. au capital de 1 000 000 DH – R.C. : 103929 – I.F. : 01901033 – C.N.S.S. : 6284153 – Patente : 30655862

Figure 10 : Rapport d'analyse d'eau de puits

L'eau de Bassin (2016)



RAPPORT D'ANALYSES D'EAU D'IRRIGATION N°C015213

Client	ELOUDAYA	Nature de l'échantillon	EAU
Province	MARRAKECH	Référence de l'échantillon	BASSIN N° 2
Commune	LOUDAYA	Préleveur	KENNI
Site prélèvement	ELOUDAYA 2	Profondeur	
Localisation GPS		Date de prélèvement	16/04/2016
		Date de réception	19/04/2016
		Date fin d'analyse	27/04/2016
		Date édition	27/04/2016

CATIONS	METHODES	mg/l	még/l	Valeurs limites admissibles (VLA) EAU D'IRRIGATION
Sodium (Na)	Flux continu	57,56	2,51	3 meq/l
Potassium (K)	Flux continu	3,49	0,09	-
Magnésium (Mg)	Flux continu	25,78	2,13	-
Calcium (Ca)	Flux continu	62,40	3,12	-
Ammonium (NH4)	Flux continu	0,73	0,05	-

ANIONS	METHODES	mg/l	még/l	Valeurs limites admissibles (VLA) EAU D'IRRIGATION
Chlorures (Cl)	Flux continu	76,83	2,17	10 meq/l
Sulfates (SO4)	Flux continu	78,30	1,64	5 meq/l
Carbonates (CO3)	NM ISO 9963-1	0,00	0,00	-
Bicarbonates (HCO3)	NM ISO 9963-1	209,28	3,44	8,5 meq/l
Nitrates (NO3)	Flux continu	3,89	0,07	2,5 meq/l
Dihydrogénophosphates (H2PO4)	Flux continu	0,18	0,01	-

OLIGO-ELEMENTS	METHODES	mg/l	Valeurs limites admissibles (VLA) EAU D'IRRIGATION
Cuivre (Cu)	*NM ISO 11885	-	2 mg/l
Zinc (Zn)	*NM ISO 11885	-	2 mg/l
Fer (Fe)	*NM ISO 11885	-	5 mg/l
Manganèse (Mn)	*NM ISO 11885	-	0,2 mg/l
Bore (B)	NM ISO 11885	-	3 mg/l

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES	METHODES	Valeurs limites admissibles (VLA) EAU D'IRRIGATION
pH	* NM ISO10523	6,5 - 8,4
Extrait sec (g/l)	NM 03.7.019	2g/l
Conductivité Electrique (mmhos/cm)	NM ISO 7888	3 mmhos/cm
% Sodium soluble		-
Carbonates Résiduel RSC		-
Fraction Sodium Absorbable SAR		9

Source (VLA) : Bulletin officiel N°5062 du 30 Ramadan 1423 (5-12-2002)

Versions en vigueur des méthodes d'analyse

Responsable de département

Directeur de laboratoire

LABOMAG
Rachida MOUHTADI
Responsable du Département

* essai accrédité
** essai réalisé in situ
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai

1, boulevard Bangkok - Route de Zenata km 10,5 - Sidi Bernoussi - 20 000 Casablanca -
Tél: 05 22 34 89 05 - Fax: + 212 522 358 364 - contact@labomag.ma - www.labomag.ma
S.A.R.L. au capital de 1 000 000 DH - R.C. : 103929 - I.F. : 01901033 - C.N.S.S. : 6284153 - Patente : 30655862
page 1/1

LABOMAG
Km 10,5 Rte Zenata Rue J.N 1
Tél: 05 22 34 49 61
Fax: 05 22 35 83 64

Figure 11 : Rapport d'analyse d'eau de bassin

- L'eau de puits et de bassin sont de bonne qualité selon les normes d'interprétation.

2.4 Système de pompage

Au niveau de bassin on trouve trois pompes qui se caractérisent par :

Nombre de chevaux de cette pompe est :

$$\text{NB-Chevaux} = \text{Kw} * \text{C}$$

$$= 30 * 1,33$$

$$= 39,9$$

Approximativement 40 chevaux



2.5 Système d'irrigation




Figure 12 : L'ordinateur d'irrigation

Grâce à la technologie, l'irrigation est contrôlée à distance, le système d'irrigation automatique est composé d'un ordinateur muni d'un logiciel qui pilote l'irrigation de toutes les parcelles de l'exploitation à partir de la station de tête. Aussi, il permet de contrôler et programmer la période d'irrigation.

La carte des parcelles qui aide à connaître l'emplacement de l'arrosage, par l'éclairage.



Figure 13 : Cartes des parcelles

2. La pluviométrie à la parcelle

On a entre les plantes 2 mètres et entre les interlignes 6 mètres, dans une zone de 1ha il y a 833 arbres et pour chaque arbre 2 goutteur, le débit est 2,1.

$$\text{Donc la pluviométrie } Ph = \frac{\frac{\text{Nombre de plantes}}{\text{ha}} \times \frac{\text{Nombre de goutteur}}{\text{Arbre}} \times \text{Débit}}{10\,000}$$

$$= (833 \times 5,33 \times 2,1) / 10000$$

$$= 0,93 \text{ mm}$$

➤ Et pour la durée d'irrigation :

$$Di = ETM / Ph$$

$$= (ET_0 \times K_c) / Ph$$

$$= (5 \times 0,6) / 0,93$$

$$= 3,22$$

Donc la durée d'irrigation est 3h et 14minutes.

3. Station de tête

3.1 Système de filtration

3.1.1 Filtre à sable

La station de tête est équipée de 9 filtres à sable. Le filtre à sable élimine les impuretés de l'eau du bassin. Le filtre à sable est constitué d'une cuve remplie d'un sable, le processus de filtrage se fait grâce à ce système en faisant passer l'eau à travers le sable à l'intérieur du filtre. Le processus de nettoyage du filtre se fait périodiquement en vidant le sable, le laver et le remettre à nouveau.



Figure 14 : Les filtres à sables

3.1.2 Filtre à tamis

Filtre à tamis est un récipient contenant une paroi filtrante ou un tamis à très petites mailles. Son rôle est de retenir les particules, l'état du tamis doit être vérifié périodiquement et changé en cas de rupture des mailles. Pour nettoyer le filtre à tamis, il doit être rincé par l'eau claire. Il faut éviter d'utiliser une brosse dure pour prévenir de casser le maillage du tamis.



Figure 15 : Les filtres à tamis

3.1.3 Filtre à disque

La filtration par ce type de filtre est assurée par un ensemble de disques entrelacés. L'eau pénètre dans une chambre axiale horizontale de forme cylindrique et ressort par deux côtés, à travers les réseaux filtrants des plateaux tournants. Les disques séparent les solides. Facile à changer de points en place. Les solides rejetés sont automatiquement renvoyés vers les entrées de décharge. Il présente les avantages d'une vitesse de filtration rapide, d'un lavage à contre-courant rapide et économe en eau, d'un faible encombrement, d'un entretien simple et d'une longue durée de vie. Ces filtres ont les avantages du filtre à sable et du filtre à tamis.



Figure 16 : Les filtres à disques

2. La fertigation

La fertigation est une technique agricole qui consiste à utiliser des nutriments solubles dans l'eau grâce à un système d'irrigation.

Les cuves A, B et C pour les engrais et le bac d'acide pour l'acide.



Figure 17 : Les cuves des engrais et l'acide



Figure 18 : Le bac de mélange des engrais



Figure 19: Pompe doseuse



Figure 20: Taux d'eau

4. La taille

La taille consiste à supprimer des rameaux qui sont en excès, ainsi que les branches gourmandes qui épuisent l'arbre. Les branches d'arbre doivent respirer et le feuillage doit être bien exposé au soleil.

↳ Les outils de taille :

Sécateur et la scie à élaguer.

- ★ En ce qui concerne les outils que les ouvriers utilisaient dans la taille, il y a le sécateur et la scie. Bien sûr, il existe bien d'autres outils pour la taille, comme la tronçonneuse élagueuse, l'échenilloir, etc...



Avant la taille



Après

Figure 21 : La taille

5. Les maladies et le traitement

5.1 Les maladies fongiques

Une maladie cryptogamique est causée par un champignon. Il y a plusieurs maladies fongiques comme la gommose, l'anthracnose et Mal secco...

▲ Au niveau d'EL OUDAYA il y a la maladie de la Gommose à *Phytophthora*

♦ Agent causal de la maladie

Causée par *Phytophthora Citrophthora* ou *Phytophthora Parasitica*. La maladie se développe principalement dans les sols lourds qui maintiennent à proximité de la collecte des arbres une humidité excessive au niveau de point de greffe.

♦ Symptômes et dégâts de la maladie

Parmi les principaux dégâts de cette maladie on cite :

- Jaunissement des feuilles
- Chute anormale et prémature des fruits
- Floraison à contre saison et apparitions de nombreux petits fruits à peau fine



Figure 22: Symptôme
de la gommose

♦ Méthodes de lutte

★ Lutte préventive :

- Utilisation d'un porte-greffe résistant à ce type de maladie
- Le point de greffe doit être situé à une hauteur minimale de 30 cm au-dessus car le problème commence au niveau de ce point
- Eviter l'irrigation gravitaire

★ Lutte curative :

- Lorsque la maladie apparaît complètement, des produits chimiques sont utilisés à base de cuivre.

5.2 Les ravageurs

La mouche méditerranéenne des fruits ou Cératite (*ceratitis capitala*) :

★ Taxonomie [8]

Règne : *Animalia*

Nom scientifique : *Ceratitis capitata*

Classe : *Insectes*

Ordre : *Diptères*

Famille : *Tephritidae*

Hôtes : insecte polyphage, il attaque le poirier, Figuiers, arganier, figuier de barbarie, et les agrumes,



Figure 23: Ceratitis Capitata

La cératite cause deux types de dégâts :

- ♦ Piqûres pour pondre ses œufs.
- ♦ Pourriture causée par les larves ou des champignons.

▲ Cycle de vie :

La femelle, après l'accouplement, pond 5 à 30 œufs dans la cavité au sein d'un fruit en creusant avec une tarière, un fruit peut contenir plusieurs cavités de ponte.

La femelle pond en moyenne 300 à 400 œufs dans un fruit. Après une période d'incubation de 3 à 5 jours pendant les mois les plus frais, ou de 2 à 3 jours en été, les larves éclosent en chenilles qui




Figure 24: Cycle de vie de la Ceratitis Capitata

se nourrissent de la pulpe des fruits. Au bout de 10 à 15 jours, les asticots se laissent tomber sur le sol et se nymphosent dans les premiers centimètres de terre.

Si les conditions de température ambiante sont favorables (température > 14°C). Après 10-11 jours en été ou 18-20 jours en hiver, les adultes de la nouvelle génération apparaissent.

➤ **La lutte préventive :**

Le piégeage :

Les pièges sont utilisés pour connaître si la cératite existe ou pas, sont installés sur des arbres témoins de nombre de 1 à 2 pièges par hectare d'une façon aléatoire.



Figure 25 : Le piège

➤ **La lutte curative :**

Lorsque le piège détecte la présence de la cératite dans la parcelle il faut utiliser les Fly Caps (Piégeages de masse). Il se base sur l'attraction sexuelle, des mouches adultes, à l'aide d'une mèche de coton imbibée de 2 ml d'une solution composée de 70% de trimedlure (l'attractif sexuel) et de 30% d'insecticide.



Figure 26 : Fly Cap

6. Conclusion

Le stage est une étape très importante dans la vie de l'étudiant car il lui permet de se connecter au milieu de l'entreprise et de faciliter son intégration dans ce milieu complètement différent de l'environnement du centre de qualification professionnelle.

En ce qui concerne mon expérience dans ce stage, c'était au niveau pour moi, par ce que c'est la première expérience de faire un stage, et la raison en était l'aide et la compréhension que j'ai reçues de tous les membres et cadres de domaine EL OUDAYA, grâce à eux l'expérience a été formidable, et durant ce mois j'ai appris diverses choses sur le domaine de l'agriculture.

Grâce à ce stage, j'ai rencontré des personnes ayant une grande expérience dans le domaine agricole, qui m'ont apporté tout le soutien et les informations toute la période de stage.

7. Cahier de journal

Les dates	Taches et les opérations
25-26/07/2022	Découvrir de domaine
27/07/2022	Formation sur la récolte
28/07/2022	Suivi de maturité interne
29/07/2022	Formation sur la récolte
01-02/08/2022	Entretien du réseau d'irrigation
03-04-05/08/2022	Bodychanage et le masticage
08/08/2022	Formation sur l'irrigation
11-12/08/2022	Mélange d'engrais et installation d'un programme d'irrigation
15-16-17/08/2022	Formation sur la taille et l'appliquer
18-19/08/2022	Formation sur les maladies (Les maladies fongiques)
22-23/08/2022	La taille et le masticage
24-25/08/2022	Formation sur les ravageurs

8. Annexe

Nomenclature du domaine EL OUDAYA 1 camp 16/17

Catégorie	carre	_variete	sup	ecart1	ecart2	arbres	_typ_plant	Age
	14101	W.NAVEL	1,11	6	6	291	PLANTE	1954
	14102	W.NAVEL	0,98	6	6	251	PLANTE	1954
	14103	W.NAVEL	1,43	6	5	472	PLANTE	1984
	14104	W.NAVEL	1,56	6	5	518	PLANTE	1984
	14105	W.NAVEL	1,28	6	5	421	PLANTE	1954
	14106	W.NAVEL	1,2	6	5	399	PLANTE	1984
	14107	W.NAVEL	1,02	6	6	246	PLANTE	1954
	14108	W.NAVEL	1,24	6	5	413	PLANTE	1986
	14109	W.NAVEL	1,24	6	5	401	PLANTE	1986
	14110	W.NAVEL	1,17	6	5	381	PLANTE	1986
	14111	W.NAVEL	1,45	6	5	482	PLANTE	1984
	14202	W.NAVEL	1,22	6	6	294	PLANTE	1954
	14204	W.NAVEL	1,24	6	6	330	PLANTE	1954
	14205	W.NAVEL	1,22	6	6	307	PLANTE	1954
	14206	W.NAVEL	1,19	6	5	393	PLANTE	1986
	14207	W.NAVEL	1,19	6	5	388	PLANTE	1986
	14209	W.NAVEL	0,72	6	5	240	PLANTE	1984
	14210	W.NAVEL	1,22	6	6	306	PLANTE	1984
	14211	W.NAVEL	1,22	6	6	321	PLANTE	1954
	14304	W.NAVEL	1,39	6	6	462	PLANTE	1984
	14305	W.NAVEL	1,01	6	6	250	PLANTE	1954
	14306	W.NAVEL	1,3	6	6	357	PLANTE	1954
	14307	W.NAVEL	1,22	6	6	335	PLANTE	1954
	14308	W.NAVEL	1,01	6	6	253	PLANTE	1954
	14309	W.NAVEL	1,3	6	6	356	PLANTE	1954
	14310	W.NAVEL	1,22	6	6	336	PLANTE	1954
	14311	W.NAVEL	1,15	6	6	281	PLANTE	1954
	24401	W.NAVEL	1,29	6	6	345	PLANTE	1954
	24402	W.NAVEL	1,22	6	6	335	PLANTE	1954
	SUP TOTAL		35,01	TOTAL ARBRES		10164		
	25101	M.LATE	4,9	6	4	2023	PLANTE	1991
	25102	M.LATE	3,22	6	4	1301	PLANTE	1991
	25103	M.LATE	2,18	6	4	871	PLANTE	1992
	25104	M.LATE	2,04	6	4	836	PLANTE	1992
	25201	M.LATE	3,76	6	4	1444	PLANTE	1991
	25202	M.LATE	3,82	6	4	1502	PLANTE	1991
	25204	M.LATE	1,24	6	6	447	PLANTE	1998
	25205	M.LATE	2,04	6	4	828	PLANTE	1992
	25403	M.LATE	0,98	6	4	404	SURGREFFE	1993
	25404	M.LATE	1	6	4	410	SURGREFFE	1993
	25405	M.LATE	1,13	6	4	467	SURGREFFE	1993
	25406	M.LATE	1,06	6	4	437	SURGREFFE	1993
	25407	M.LATE	0,5	6	4	197	SURGREFFE	1993
	25408	M.LATE	0,96	6	4	390	SURGREFFE	1993

DOMAIONES AGRICOLES
DOMAINE EL OUDAYA

Nomenclature du domaine EL OUDAYA 1 camp 16/17

ESPECE	Catégorie	carre	_variete	sup	ecart1	ecart2	arbres	_typ_plant	Age
AGRUMES	ORANGES	25409	M.LATE	1,08	6	4	447	SURGREFFE	1993
		25410	M.LATE	1,02	6	4	425	SURGREFFE	1993
		25411	M.LATE	0,23	6	4	90	SURGREFFE	1993
		25412	M.LATE	1,08	6	4	442	SURGREFFE	1993
		25413	M.LATE	1,5	6	4	613	SURGREFFE	1993
		15208	M.LATE	1,12	6	5	372	SURGREFFE	1993
		15301	M.LATE	1,19	6	5	395	SURGREFFE	1993
		15302	M.LATE	1,19	6	5	394	SURGREFFE	1993
		15303	M.LATE	1,12	6	5	368	SURGREFFE	1993
		SUP TOTAL			38,36	TOTAL ARBRES		15.103	
		33103	A.TAOUJDAT	1,94	6	2	1617	PLANTE	2007
		33104	A.TAOUJDAT	1,97	6	2	1639	PLANTE	2007
		33201	A.TAOUJDAT	4,16	6	2	3430	PLANTE	2007
		33202	A.TAOUJDAT	4,16	6	2	3430	PLANTE	2007
		33203	A.TAOUJDAT	3,35	6	2	2754	PLANTE	2007
		33204	A.TAOUJDAT	0,78	6	2	649	PLANTE	2007
		33205	A.TAOUJDAT	2,27	6	2	1892	PLANTE	2007
		SUP TOTAL			18,63	OTAL ARBRES		15.411	
		31301	NOUR	4,16	6	2	3430	PLANTE	2007
		31302	NOUR	3,67	6	2	3026	PLANTE	2007
		31303	NOUR	4,41	6	2	3640	PLANTE	2007
		31304	NOUR	1,42	6	2	1180	PLANTE	2007
		21203	NOUR	1,22	6	6	290	PLANTE	1981
		21301	NOUR	2,36	6	2	1931	PLANTE	2007
		21302	NOUR	7,41	6	2	6112	PLANTE	2007
		21502	NOUR	1,94	6	2	1617	PLANTE	2007
		SUP TOTAL			26,59	OTAL ARBRES		21.226	
		32101	SIDI AISSA	2,48	6	2	2058	PLANTE	2007
		32102	SIDI AISSA	4,16	6	2	3430	PLANTE	2007
		22501	SIDI AISSA	4,93	6	2	4070	PLANTE	2007
		22503	SIDI AISSA	1,73	6	2	1437	PLANTE	2007
		SUP TOTAL			13,3	OTAL ARBRES		10.995	

NOUVELLE CREATION NOUR 17/18

Creation 17/18	Carre	_Variete	Sup	Ecart1	Ecart2	Arbres	_typ_plant	Age
	19401	LAVAL	10	6	4	4160	PLANTE	18/19
	15402	M LATE	1,5	6	4	624	PLANTE	18/19
	35401	M LATE	11,5	6	4	4784	PLANTE	18/19
	TOTAUX		23	*****	*****	9568		

F1 : La distribution et la nomenclature des cultures

F2 : Suivi des analyses de maturité des Agrumes 2017

Date	Pile	FRUIT			Jus							
		Poid brut (g)	Tare	Poid net (g)	Poid brut (g)	Tare (g)	Poid net (g)	% de jus	Brix E	Acidité		Rapport E/A
										Volume NaoH	%d'acide A	
10/2/2017	22501	2003	-	2003	1180	120.2	1059.8	53%	10	24	1.54	6.5
10/13/2017	22501	2000.52	-	2000.52	1207.15	120.2	1086.95	54%	11	21.5	1.37	8.03
10/16/2017	52203	2031.46	-	2031.46	1247.58	120.2	1127.38	55%	8.5	16	1.02	8.33
10/23/2017	33201	2003.07	-	2003.07	1045.72	120.13	925.59	46%	11	16.5	1.024	10.74
10/23/2017	32101	2039.94	-	2039.94	1198.24	120.13	1078.11	53%	11	16.5	1.05	10.47
11/10/2017	52203	-	-	2001.36	-	-	1200	60%	11	16	1.02	10.78
11/10/2017	33201	-	-	2004.02	-	-	1299.47	65%	12	15	0.96	12.5

9. Référence

- [1] : <https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2022/marrakech/valeurs/60230.html>
- [2] : L'office de HAOUZ
- [3] : <https://agronomie.info/fr/origine-et-classification-des-agrumes/>
- [4] : <https://fellah.ma/la-filiere-dagrumes-au-maroc/>
- [5] : <https://www.agriculture.gov.ma/ar/programme/exportation>
- [6] : <http://moroccancitrus.com/produits.html>
- [7] : <https://plandejardin-jardinbiologique.com/choisir-porte-greffe-agrume.html>
- [8] : <https://www.cabi.org/isc/datasheet/12367>